


**Séminaire thésards LIAFA/PPS**

***Graphes 2-intervallaires  
et classes de graphes  
d'intersection apparentées***

**Philippe Gambette**

<http://philippe.gambette.free.fr/LIAFA>



# Plan


---

- **Graphes d'intervalles et énigme policière**
- **D'autres classes de graphes d'intersection**
- **Graphes 2-intervallaires**
- **Restrictions sur les graphes 2-intervallaires équilibrés**
- **Graphes 2-intervallaires équilibrés**
- **Quelques motivations pour les 2-intervallaires**
- **Problème du stable maximum**
- **Variante de la classe des graphes 2-intervallaires**
- **Séquences arc-annotées**
- **Graphes  $\{\cap, \sqsubset\}$ -(1,1)-intervallaires**


# Les graphes d'intervalles

des noeuds  $\Leftrightarrow$  des ensembles

$$\mathcal{I} = \{[0,2], [1,3], [3,4]\}$$



une **arête**  
entre deux  
noeuds  $\Leftrightarrow$  les deux ensembles  
ont une **intersection**  
**non vide**




$\mathcal{I}$  est une **réalisation** du **graphe d'intersection**  $G$ .

$G$  est un **graphe d'intervalles**.

# Qui a tué le Duc de Denismore ?

Une nouvelle de **Claude Berge**, un des fondateurs de l'**Oulipo** et de la **théorie des graphes moderne** (1926-2002).



Claude Berge, *Qui a tué le Duc de Denismore ?*,  
La Bibliothèque oulipienne, n°67, 1994.



# Qui a tué le Duc de Densmore ?

Le duc de Densmore est retrouvé mort dans l'explosion d'une pièce de son château de l'île de White. Le meurtre a été commis à l'aide d'une bombe placée avec précaution dans le labyrinthe du château, ce qui a nécessité une longue préparation en cachette dans le labyrinthe.

Or, avant son assassinat, le duc avait invité 8 femmes sur l'île, celles-ci se rappellent quelles autres femmes elles y ont vu, mais ont oublié à quelle date précise elles y étaient :

- Ann a vu Betty, Cynthia, Emily, Felicia et Georgia
- Betty a vu Ann, Cynthia et Helen
- Cynthia a vu Ann, Betty, Diana, Emily et Helen
- Diana a vu Cynthia et Emily
- Emily a vu Ann, Cynthia, Diana et Felicia
- Felicia a vu Ann et Emily
- Georgia a vu Ann et Helen
- Helen a vu Betty, Cynthia et Georgia

Le marin qui faisait la navette vers l'île a aussi oublié les dates, mais il se souvient n'avoir transporté chacune que pour un seul aller retour.

# Qui a tué le Duc de Densmore ?

Le duc de Densmore est retrouvé mort dans l'explosion d'une pièce de son château de l'île de White. Le meurtre a été commis à l'aide d'une bombe placée avec précaution dans le labyrinthe du château, ce qui a nécessité une longue préparation en cachette dans le labyrinthe.

Or, avant son assassinat, le duc avait invité 8 femmes sur l'île, celles-ci se rappellent quelles autres femmes elles y ont vu, mais ont oublié à quelle date précise elles y étaient :

- Ann a vu Betty, Cynthia, Emily, Felicia et Georgia
- Betty a vu Ann, Cynthia et Helen
- Cynthia a vu Ann, Betty, Diana, Emily et Helen
- Diana a vu Cynthia et Emily
- Emily a vu Ann, Cynthia, Diana et Felicia
- Felicia a vu Ann et Emily
- Georgia a vu Ann et Helen
- Helen a vu Betty, Cynthia et Georgia

Le marin qui faisait la navette vers l'île a aussi oublié les dates, mais il se souvient n'avoir transporté chacune que pour **un seul aller retour**.

# Qui a tué le Duc de Densmore ?

Le duc de Densmore est retrouvé mort dans l'explosion d'une pièce de son château de l'île de White. Le meurtre a été commis à l'aide d'une bombe placée avec précaution dans le labyrinthe du château, ce qui a nécessité une longue préparation en cachette dans le labyrinthe.

Or, avant son assassinat, le duc avait invité 8 femmes sur l'île, celles-ci **se rappellent quelles autres femmes elles y ont vu**, mais ont oublié à quelle date précise elles y étaient :

- Ann a vu Betty, Cynthia, Emily, Felicia et Georgia
- Betty a vu Ann, Cynthia et Helen
- Cynthia a vu Ann, Betty, Diana, Emily et Helen
- Diana a vu Cynthia et Emily
- Emily a vu Ann, Cynthia, Diana et Felicia
- Felicia a vu Ann et Emily
- Georgia a vu Ann et Helen
- Helen a vu Betty, Cynthia et Georgia

Le marin qui faisait la navette vers l'île a aussi oublié les dates, mais il se souvient n'avoir transporté chacune que pour **un seul aller retour**.

# Qui a tué le Duc de Densmore ?

Le duc de Densmore est retrouvé mort dans l'explosion d'une pièce de son château de l'île de White. Le meurtre a été commis à l'aide d'une bombe placée avec précaution dans le labyrinthe du château, ce qui a nécessité une longue préparation en cachette dans le labyrinthe.

Or, avant son assassinat, le duc avait invité 8 femmes sur l'île, celles-ci **se rappellent quelles autres femmes elles y ont vu**, mais ont oublié à quelle date précise elles y étaient :


- Ann a vu Betty, Cynthia, Emily, Felicia et Georgia
- Betty a vu Ann, Cynthia et Helen
- Cynthia a vu Ann, Betty, Diana, Emily et Helen
- Diana a vu Cynthia et Emily
- Emily a vu Ann, Cynthia, Diana et Felicia
- Felicia a vu Ann et Emily
- Georgia a vu Ann et Helen
- Helen a vu Betty, Cynthia et Georgia

**Le graphe de la relation « a vu » doit être un graphe d'intervalles.**

Le marin qui faisait la navette vers l'île a aussi oublié les dates, mais il se souvient n'avoir transporté chacune que pour **un seul aller retour**.




# Qui a tué le Duc de Densmore ?



Tout **sous-graphe induit** par un sous-ensemble de sommets doit être un **graphe d'intervalles**.

# Qui a tué le Duc de Densmore ?




Tout **sous-graphe induit** par un sous-ensemble de sommets doit être un **graphe d'intervalles**.

Sous-graphe problématique :

-  $G[\{a,b,g,h\}]$

# Qui a tué le Duc de Densmore ?




Tout **sous-graphe induit** par un sous-ensemble de sommets doit être un **graphe d'intervalles**.

Sous-graphes problématiques :

- $G[\{a, b, g, h\}]$
- $G[\{a, c, g, h\}]$

# Qui a tué le Duc de Densmore ?




Tout **sous-graphe induit** par un sous-ensemble de sommets doit être un **graphe d'intervalles**.

Sous-graphes problématiques :

- $G[\{a, b, g, h\}]$
- $G[\{a, c, g, h\}]$
- $G[\{a, b, c, d, e, f\}]$

# Qui a tué le Duc de Denismore ?




Tout **sous-graphe induit** par un sous-ensemble de sommets doit être un **graphe d'intervalles**.

Sous-graphes problématiques :

- $G[\{a, b, g, h\}]$
- $G[\{a, c, g, h\}]$
- $G[\{a, b, c, d, e, f\}]$

# Qui a tué le Duc de Densmore ?



Tout **sous-graphe induit** par un sous-ensemble de sommets doit être un **graphe d'intervalles**.

Sous-graphes problématiques :

- $G[\{a, b, g, h\}]$
- $G[\{a, c, g, h\}]$
- $G[\{a, b, c, d, e, f\}]$

**Ann est certainement la coupable !**

# Qui a tué le Duc de Densmore ?

---

Que doit-on retenir de cette histoire ?

# Qui a tué le Duc de Densmore ?

---

Que doit-on retenir de cette histoire ?

- avec les analyses ADN, la théorie des graphes est un des **nouveaux outils d'investigation moderne** à disposition des policiers.



# Qui a tué le Duc de Densmore ?


Que doit-on retenir de cette histoire ?

- la classe des graphes d'intervalles est **bien connue** et caractérisée, il existe des **algorithmes linéaires de reconnaissance** [Habib,McConnell,Paul,Viennot,2000 - Booth,Lueker,1976],
- on s'est un peu familiarisés avec les graphes d'intervalles et les contraintes sur la **réalisation** d'un graphe d'intervalles,
- en particulier, les **sous-graphes interdits** d'une classe de graphes,
- on a vu un exemple de ce que peuvent modéliser les graphes d'intervalles : un ensemble d'**intervalles de temps**.


# Les graphes trapézoïdaux

$$\mathcal{T} = \{([0,1],[0,1]), ([2,3],[4,6]), ([5,6],[0,3])\}$$

des noeuds  $\Leftrightarrow$  des ensembles




une **arête** entre deux noeuds  $\Leftrightarrow$  les deux ensembles ont une **intersection non vide**





$G$  est un *graphe trapézoïdal*.

# Classes de graphes

Tout graphe d'intervalles est un graphe trapézoïdal.




$$\mathcal{I} = \{[0,2], [1,3], [3,4]\} \quad \Longrightarrow \quad \mathcal{T} = \{([0,2],[0,2]), ([1,3],[1,3]), ([3,4],[3,4])\}$$




La **classe** de graphes d'intervalles **est incluse** dans celle des graphes trapézoïdaux.


# Graphe d'inclusion des classes de graphes




# Graphe d'inclusion des classes de graphes



# Graphe d'inclusion des classes de graphes






# Graphe d'inclusion des classes de graphes




Graphe de **permutation** :  
 graphe d'intersection des  
 segments  $(k, k)$ .


↑  
 ligne des  $i$     ligne des  $\pi(i)$



# Graphe d'inclusion des classes de graphes




Graphe d'**arcs circulaires** :  
graphe d'intersection d'**arcs**  
d'un **cercle**.






# Graphe d'inclusion des classes de graphes





Graphe **adjoint** :  
 graphe d'intersection des  
 arêtes d'un graphe.




# Graphe d'inclusion des classes de graphes






Graphe **triangulé** :  
 graphe d'intersection  
 d'une famille de  
**sous-arbres d'un arbre.**




# Graphe d'inclusion des classes de graphes




Graphe **de cordes** :  
 graphe d'intersection des  
**cordes d'un cercle.**




# Graphe d'inclusion des classes de graphes



The star of the show,  
graphe **2-intervallaire** :  
graphe d'intersection  
d'unions de deux intervalles.



intervalles support de  $I^4$




# Reconnaissance des graphes 2-intervallaires

Déterminer, pour un graphe  $G$  quelconque, s'il est 2-intervallaire, est **NP-complet** [West, Shmoys, 1984]

Idée de la preuve :

Par réduction du problème de **Cycle Hamiltonien** (*il existe un chemin dans le graphe fourni en entrée passant une seule fois par tous les sommets et revenant au sommet d'origine sans emprunter deux fois la même arête*) **sur les graphes 3-réguliers** (*tous les sommets ont trois voisins*), qui est **NP-complet** [Garey, Johnson, Tarjan, 1976].

West et Shmoys réduisent d'abord ce problème à **Cycle Hamiltonien sur les graphes 3-réguliers sans triangle**.




# Reconnaissance des graphes 2-intervallaires

Idée de la preuve que reconnaître les 2-inter. est NP-complet :

Puis, pour tout **graphe  $G$  3-régulier sans triangle**, ils construisent en temps polynomial un graphe  **$G'$  qui est 2-intervallaire ssi  $G$  admet un cycle hamiltonien.**

L'idée : si  $G$  a un cycle hamiltonien, ajouter des gadgets sur  $G$  pour obtenir  $G'$  dont toute réalisation 2-intervallaire sera une  $H$ -représentation :



# Graphes 2-intervallaires et restrictions

**Support** d'un ensemble de 2-intervalles :

ensemble des **intervalles support** des 2-intervalles.

Support sans restriction : 

Support **équilibré** : 

Support **unitaire** : 



Support **disjoint** : 

↳ graphes (1,1)-intervallaires : 

↳ séquences arc-annotées : 

# Classe des 2-intervallaires équilibrés


Graphe 2-intervallaire non équilibrable, et une réalisation en 2-intervalles




La classe des 2-intervallaires équilibrés est **strictement incluse** dans la classe des graphes 2-intervallaires.



# Les gadgets utilisés




Toute réalisation de ce graphe 2-intervallaire est **contiguë** (et le graphe est 2-intervallaire unitaire)




Ces ensembles de 2-intervalles vont jouer le rôle de « **blocs** » de 2-intervalles.

# Les gadgets utilisés





Toute réalisation de ce graphe impose l'ordre des « blocs »  $J_i$



# Classe des 2-intervallaires équilibrés

Graphe 2-intervallaire non équilibrable, et une réalisation en 2-intervalles



Mais la reconnaissance de la classe des graphes 2-intervallaires équilibrés reste **NP-complète** !  
(adaptation de la preuve de West et Shmoys)


# Motivations

---



Un **2-intervalle** modélise :

- une tâche coupée en 2 dans un problème d'**ordonnement**
- deux portions similaires ou complémentaires inversées d'**ADN**
- deux portions complémentaires et inversées d'**ARN**
- deux extraits « mis en relation » dans une **partition musicale**

# Motivations : cas de l'ARN






**Hélices** : appariements de portions successives ou emboîtées d'ARN.



# Motivations : cas de l'ARN

**Pseudo-noeud :**  
appariement de nucléotides  
entrelacés.




Extrémité 5' du composant  
ARN de la télomérase humaine


D'après D.W. Staple, S.E. Butcher, *Pseudoknots: RNA structures with Diverse Functions* (PloS Biology 2005 3:6 p.957)

# Vers la théorie des graphes : stable max

Trouver les **hélices** d'un ARN sans pseudo-noeud donné comme une suite de nucléotides.



Trouver le plus **grand sous-ensemble** de 2-intervalles **disjoints**, uniquement **successifs ou emboîtés**, dans un ensemble de 2-intervalles.




Trouver le **stable maximum** du graphe tel que :

- les **sommets** correspondent aux **2-intervalles**,
- une **arête** joint deux 2-intervalles qui **s'intersectent**,
- une **arête** joint deux 2-intervalles **croisés**.


# Graphes 2-intervallaires et variantes

16 variantes de la classe des graphes de 2-intervalles :


- les **sommets** correspondent aux **2-intervalles**
- une **arête** joint deux 2-intervalles qui sont :




intersectants



successifs



emboîtés



croisés

↳ 8 classes à caractériser (et leur complémentaire)



# Variantes des graphes 2-intervallaires

Support :


sans restriction

disjoint



$\{\frown, \sqsubset, <, \emptyset\}$	clique	clique
$\{\frown\}$	2-intervallaires	(1,1)-intervallaires
$\{\frown, \sqsubset\}$	Classes inconnues, stable max NP-complet	Classe inconnue, stable max inconnu
$\{\frown, <\}$		Classe inconnue, stable max polynomial
$\{\frown, \emptyset\}$	Inclusions utiles dans des classes de graphes	cordes
$\{\frown, \sqsubset, <\}$		<u>cordes</u>
$\{\frown, \sqsubset, \emptyset\}$	intervalles	intervalles
$\{\frown, <, \emptyset\}$	trapézoïdaux	permutation

# Classe des $\{\curvearrowright, \square\}$ -(1,1)-intervallaires




Un graphe  $\{\curvearrowright, \square\}$ -(1,1)-intervallaire est l'union  
d'un **graphe adjoint** et d'un **graphe de permutation**.






# Classe des $\{\cap, \sqsubset\}$ -(1,1)-intervallaires



Les **cycles** sont des graphes  $\{\cap, \sqsubset\}$ -(1,1)-intervallaires.






# Classe des $\{\cap, \sqsubset\}$ -(1,1)-intervallaires



**classe** classe de graphes ne contenant pas celle des  $\{\cap, \sqsubset\}$ -(1,1)-intervallaires

Les **cycles** sont des graphes  $\{\cap, \sqsubset\}$ -(1,1)-intervallaires.


# Classe des $\{\cap, \sqsubset\}$ -(1,1)-intervallaires



**classe** classe de graphes ne contenant pas celle des  $\{\cap, \sqsubset\}$ -(1,1)-intervallaires



Les **cycles** sont des graphes  $\{\cap, \sqsubset\}$ -(1,1)-intervallaires.

# Classe des $\{\cap, \sqsubset\}$ -(1,1)-intervallaires




Les **bipartis complets** sont des graphes  $\{\cap, \sqsubset\}$ -(1,1)-intervallaires.

**classe** classe de graphes ne contenant pas celle des  $\{\cap, \sqsubset\}$ -(1,1)-intervallaires



# Classe des $\{\curvearrowright, \sqsubset\}$ -(1,1)-intervallaires



**classe** classe de graphes ne contenant pas celle des  $\{\curvearrowright, \sqsubset\}$ -(1,1)-intervallaires

Les **graphes de permutation** sont des graphes  $\{\curvearrowright, \sqsubset\}$ -(1,1)-intervallaires.

# Classe des $\{\cap, \square\}$ -(1,1)-intervallaires

Trouver des **graphes interdits** :

- Y en a-t-il, de quelle taille ?
- Peut-on en exhiber ?



# Classe des $\{\curvearrowright, \square\}$ -(1,1)-intervallaires

Trouver des **graphes interdits** :

- Y en a-t-il, de quelle taille ?
- Peut-on en exhiber ?

Tous les graphes  
à 5 noeuds ou moins sont  
 $\{\curvearrowright, \square\}$ -(1,1)-intervallaires.

# Classe des $\{\frown, \square\}$ -(1,1)-intervallaires

Trouver des **graphes interdits** :

- Y en a-t-il, de quelle taille ?

↳ Majorer le nombre de graphes  $\{\frown, \square\}$ -(1,1)-intervallaires à  $n$  noeuds.

# Classe des $\{\frown, \square\}$ -(1,1)-intervallaires

Trouver des **graphes interdits** :

- Y en a-t-il, de quelle taille ?

↳ Majorer le nombre de graphes  $\{\frown, \square\}$ -(1,1)-intervallaires à  $n$  noeuds.

↳ par le nombre de séquences arc-annotées à  $n$  arcs.

# Énumération des séquences arc-annotées


Trouver des **graphes interdits** :

- Y en a-t-il, de quelle taille ?

↳ Majorer le nombre de graphes  $\{\frown, \sqsubset\}$ - $(1,1)$ -intervallaires à  $n$  noeuds.

↳ par le nombre de séquences arc-annotées à  $n$  arcs.

Nombre de séquences arc-annotées à  $n$  arcs et  $e$  extrémités  
(récursivement par rapport aux extrémités)



$$AA(n, e) = 1_{e=n+1} +$$

$$\sum_{x=1}^{e-1} \sum_{y=0}^x AA(n-x, e-1-y) \binom{e-1}{y} \binom{e-1-y}{x-y}$$

# Énumération des séquences arc-annotées


Trouver des graphes interdits :

- Y en a-t-il, de quelle taille ?

↳ Majorer le nombre de graphes  $\{\frown, \square\}$ - $(1,1)$ -intervallaires à  $n$  noeuds.

↳ par le nombre de séquences arc-annotées à  $n$  arcs.

Nombre de séquences arc-annotées à  $n$  arcs et  $e$  extrémités (récurivement par rapport aux extrémités)



$$AA(n, e) = 1_{e=n+1} +$$

$$\sum_{x=1}^{e-1} \sum_{y=0}^x AA(n-x, e-1-y) \binom{e-1}{y} \binom{e-1-y}{x-y}$$

$$AA(n) = \sum_{e=1}^{2n} AA(n, e)$$


# Classe des $\{\curvearrowright, \square\}$ -(1,1)-intervallaires

Trouver des graphes interdits :

- Y en a-t-il, de quelle taille ?

↳ Majorer le nombre de graphes  $\{\curvearrowright, \square\}$ -(1,1)-intervallaires à  $n$  noeuds.

↳ par le nombre de séquences arc-annotées à  $n$  arcs.




Il existe un graphe à 16 noeuds qui n'est pas  $\{\curvearrowright, \square\}$ -(1,1)-intervallaire.


# Classe des $\{\cap, \sqsubset\}$ -(1,1)-intervallaires

Trouver des **graphes interdits** :

- Y en a-t-il, de quelle taille ? *Il en existe, de taille 16.*
- Peut-on en exhiber ? *On en exhibe un de taille 9 :*




a 40 réalisations en  
séquence arc-annotée.



# Classe des $\{\cap, \sqcup\}$ -(1,1)-intervallaires

Trouver des **graphes interdits** :

- Y en a-t-il, de quelle taille ? *Il en existe, de taille 16.*
- Peut-on en exhiber ? *On en exhibe un de taille 9 :*



n'a aucune réalisation en  
séquence arc-annotée.

Ce graphe **n'est pas**  $\{\cap, \sqcup\}$ -(1,1)-intervallaire.



# Conclusion

- De nouveaux résultats :
  - l'inclusion stricte de la classe des graphes 2-intervallaires équilibrés dans celle des 2-intervallaires, mais la reconnaissance de cette classe est encore NP-difficile.
  - quelques éléments de caractérisation de la classe des graphes  $\{\curvearrowright, \square\}$ -(1,1)-intervallaires.
- Des problèmes de complexité qui restent ouverts.
  - piste pour un algorithme polynomial pour le problème du stable max : caractérisation en partant du diagramme de Hasse.
  - complexité de la reconnaissance des  $(k,k)$ -intervallaires : toujours ouvert.